

OMEX

प्रति एकड़ अधिक उपज पाने हेतु

ओमेक्स

अदरक शेड्यूल

फसल पोषण जरूरत (अपटेक)	N	P	K	Ca	Mg	Fe	Mn	Zn	Cu
	70	17	117	8.8	9.1	1.8	0.5	0.013	0.04

फसल को क्या देना चाहिए ?	खाद/हेक्टर	खाद/एकड़	बेसल डोस (एकड़)	फर्टिगेशन (एकड़)
	नत्र : फास्फोरस : पोटाश 120 : 75 : 75	N : P ₂ O ₅ : K ₂ O 48 : 30 : 30	N : P ₂ O ₅ : K ₂ O 13.2 : 28.88 : 19.8	N : P ₂ O ₅ : K ₂ O 39.6 : 21.03 : 26.4



अच्छे अंकुरण हेतु बीजोपचार

किंगफॉल ज़िंक 70 - 2 मिली प्रति किलो कन्द

ज़िंक
↓
इंडोल ऐसिटिक एसिड (IAA)
↓
जोरदार अंकुरण



• खाद को ज़िंक कोटींग करे •


किंगफॉल ज़िंक 70 - 100 मिली युरिया अथवा डिएपी 1 बोरी के लिए

नत्रजन बह जाना समस्या की रोकथाम और नत्रजन पौधे को अधिक मात्रा में मोहय्या करने हेतु ज़िंक कोटींग अतिआवश्यक है ।

नुकसा 2

अदरक सड़न की रोकथाम

0 - 25 दिन



गिली सड़न (जिवाणू या पिथियम) और सुखी सड़न (फुजेरियम) के लिए फसल को प्रतिरोधशक्ती प्रदान करता है ।

पत्तियाँ पिली होना एवं सड़न के शुरुवाती लक्षण के चलते जिनर्जी की ड्रैचिंग करे ।

प्रयोग कैसे करे एवं मात्रा - ड्रैचिंग 1 मिली/लिटर पानी अथवा टपक सिचाई 250 मिली प्रति एकड़ ।



अतिरिक्त सुझाव - फफुंदनाशक १) मेटाक्झिल + मैन्कोजेब २) सुडोमोनास + ट्रायको

नुस्सा
3



अधिक मात्रा में जड़े और फुटान

26 - 60 दिन

- ▶ ओमेक्स बायो 20 से जादा मात्रा में सफेद जड़े मिलती है ।
- ▶ जादा पत्तियाँ मिलती है ।
- छिड़कांव - 2 मिली/लितर पानी
- टपक सिचाई - 400 मिली प्रति एकड़



अतिरिक्त सुझाव -
टपक सिचाईद्वारा

MAP (12:61:0)
हफ्ते में 2 किलो/एकड़

Urea (46:0:0)
हफ्ते में 1 किलो/एकड़

नुस्सा
4



कन्द का आकार बढ़ाना (ग्रैंड ग्रोथ)

90 दिन से कंद की शुरूवात

61 - 120 दिन

- ▶ फसल की भुख जादा होती है ।
- ▶ किन्तु डीएपी जैसे खाद के फास्फोरस पोषकतत्व जादा क्रियाशिल होने से पोषण में रुकावट आती है ।
- ▶ उपाय - अल्बर्ट सोल्युशन सभी पोषकतत्वों से भरपूर है और सही मात्रा में पोषण देता है।
फसल वृद्धि के मुख्य चरण (ग्रैंड ग्रोथ) में अल्बर्ट देना अतिआवश्यक है ।
मात्रा : टपक सिचाई - 2 किलो प्रति एकड़ हफ्ते में एक बार ।
- ▶ मायक्रोमैक्स माह में दो बार छिड़कांव आवश्यक है। सभी सुक्ष्म पोषकतत्वों की परिपूर्ति ।
मात्रा : छिड़कांव - 1 मिली/लितर पानी
टपक सिचाई - 250 मिली प्रति एकड़



मायक्रोमैक्स

अतिरिक्त सुझाव -
टपक सिचाईद्वारा

MKP (0:52:34)
हफ्ते में 2 किलो/एकड़

पोटाशियम नाइट्रेट (13:0:45)
हफ्ते में 4 किलो/एकड़

नुस्सा
5



पत्तियों का कस कंद में उतारना

135 दिन से कंद विकास की शुरूवात

121 - 180 दिन

- ▶ ओमेक्स सिक्वेन्शियल 2 का छिड़कांव उत्पाद की क्वालिटी एवं वजन बढ़ाता है ।
- मात्रा : छिड़कांव - 2 मिली/लितर पानी अथवा टपक सिचाई - 400 मिली प्रति एकड़



अतिरिक्त सुझाव -
टपक सिचाई द्वारा

SOP (0:0:52)
हफ्ते में 4 किलो/एकड़

ओमेक्स उत्पाद छिड़कांव संबंधी विशेष जानकारी

- 1) सुबह दस बजे के पहले या शाम के समय छिड़कांव करें। इस्तेमाल हेतु ओमेक्स उत्पाद का घोल बनाते वक्त बोतल अच्छे से हिलाकर उपयोग में लाना जरूरी है।
छिड़कांव करते समय शाखाओं और पत्तियों का पुरी तरह से भिगना जरूरी है।
- 2) जिक छिड़कांव हेतु द्रावण बनाते समय जिक ७0 केवल आधा मिली प्रति लितर पानी, इसी मात्रा का प्रयोग करें। इससे जादा मात्रा में जिक ७0 का इस्तेमाल ना करें।
- 3) ओमेक्स उत्पाद जादातर किटनाशक, फ्रूटनाशक एवं खाद के साथ इस्तेमाल किये जा सकते है। परंतु इस्तेमाल से पहले जार टेस्ट करना बहुत जरूरी है।

महत्वपूर्ण सूचना (Disclaimer)

हमारे उत्पाद का उपयोग हमारे नियंत्रण से बाहर है । इसलिए हम केवल उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी देते हैं । फसलों की बीमारियों, कीटों और जलवायु परिवर्तन के अनुसार, विशेषज्ञ की सलाह से कवकनाशी और कीटनाशकों का छिड़कांव करें ।

