

OMEX

S.
Cu N Fe
Co Mo P Mn Ca
Bo Cu



पानांचा पिवळेपणा टाळा
उत्पादन वाढवा!
ओमेक्स किंगफॉल झिंक
वापरा!

गुणवत्तापूर्ण आणि अधिक

मका

उत्पादनासाठी

ओमेक्स इंग्लंडचे दर्जेदार पिकपोषण

(Corn Plant Nutrition Program)
Improved Corn Production Technology (2018-19)

Bio 20
+
Zinc 70



Emergence
Coleoptile



2 Leaves



4 Leaves
Early
Whorl



8 Leaves
Mid-Whorl
25 - 30

Sequential 2



12 Leaves
Late
Whorl



Tasseling
50 - 55



Silk
Pollination



Maturity

Vigour

The Plant Nutrition Company



अल्बर्ट सोल्युशन
Water Soluble Fertilizer
N:P:K:Mg:Ca + सुक्ष्मअन्नद्रव्ये
10:9:16:2:13



बायो 20
एक्लोनिया मॅक्झिमा सीवीड
NPK 20:20:20% +
सुक्ष्मअन्नद्रव्ये



किंगफॉल झिंक 70
ऑक्साईड स्वरुपातील
70% झिंक



सिक्वेंशियल 2
NPK 10:20:40%
+ सुक्ष्मअन्नद्रव्ये



मायक्रोमॅक्स
मॅग्नेशियमसह सर्व
सुक्ष्मअन्नद्रव्ये

All Products FCO Registered

ओमेक्स प्रोडक्टस् मका पिकात वापराचा मार्गदर्शक तक्ता

लागवडीनंतर	ओमेक्स प्रोडक्टस् आणि वापराचे प्रमाण	वापराची पद्धत	फायदे
बीजप्रक्रिया	किंगफॉल झिंक ७० - ३ मिली प्रति किलो बियाण्यासाठी	चोळणे	पिकवाढीच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत आवश्यक.
बेसल डोस लागवडीच्या वेळी किलो प्रति एकर	खताचे प्रमाण युरिया - ३५ सिंगल सुपर फास्फेट - १२५ म्युरेट ऑफ पोटाश - २५	अथवा	अन्नद्रव्यांची आवश्यकता नत्र - ५० स्फुरद - २५ पालाश - १५
बेसल डोस दिल्यावर ३० दिवसानंतर - युरिया ३५ किलो प्रति एकर + अल्बर्ट सोल्युशन २ किलो प्रति एकर			
बेसल डोस दिल्यावर ४५ दिवसानंतर - युरिया ३५ किलो प्रति एकर + अल्बर्ट सोल्युशन २ किलो प्रति एकर			
खतावर कोटींग (खताला चोळणे)	किंगफॉल झिंक ७० - खताच्या एका पोत्यासाठी १०० मिली झिंक	युरिया व डिएपी कोटींग	नत्राचे लिचिंगद्वारे होणारे नुकसान टाळून अधिक प्रमाणात नत्र पिकाला उपलब्ध होते.
८-१० पाने (२५-३० दिवस)	बायो २० - २ मिली प्रति लिटर पाणी + किंगफॉल झिंक ७० - अर्धा मिली प्रति लिटर पाणी	फवारणी	पानांची रुंदी वाढते. सफेद मुळी जोमाने वाढते. तणनाशकाचा पिकावर आलेला ताण कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम सीवीड.
फुले येण्याअगोदर (४० ते ५० दिवस)	मायक्रोमॅक्स - १ मिली प्रति लिटर पाणी	फवारणी	सर्व सुक्ष्मअन्नद्रव्यांची कमतरता भरून काढते.
कणीस निघतांना (५०-५५ दिवस)	सिक्वेंशियल २ - २ मिली प्रति लिटर पाणी	फवारणी	कणसाची साईज, वजन वाढते आणि एकूण उत्पादनात वाढ होते.

ओमेक्स प्रोडक्ट फवारतांना घ्यावयाची काळजी

- १) फवारणी सकाळी १० च्या पूर्वी किंवा सायंकाळी करावी. फवारणी द्रावण तयार करण्या पूर्वी ओमेक्स प्रोडक्टची बाटली व्यवस्थित हलवून घ्यावी. फवारणी करतांना फांद्या व पाने संपूर्ण भिजतील अशा पद्धतीने करावी.
- २) झिंक फवारणी करतांना ०.५ मिली (अर्धा मिली) प्रति लिटर पाणी यापेक्षा जास्त प्रमाण घेऊ नये.
- ३) वरील उत्पादने बहुतांशी कितकनाशक, बुरशीनाशक व खते यासोबत वापरता येतात. परंतु खबरदारीचा उपाय म्हणून जार टेस्ट करणे गरजेचे आहे.

नॉट Disclaimer



आमच्या उत्पादनांचा वापर आमच्या नियंत्रणाबाहेर असल्याने आम्ही फक्त उत्पादनांच्या गुणवत्तेची हमी देतो. पिकांवरील रोग, किडीचे प्रमाण, हवामानातील बदल यावर अवलंबून गरजेनुसार तज्ञांच्या सल्ल्याने बुरशीनाशक व कितकनाशकांची फवारणी करावी.

17 June 2020_2k

• रामेश्वर शिंदे (सिल्लोड) - 94040 08960

• राहुल पाटील (कन्नड) - 99759 04208

• दिपक इंगळे (उस्मानाबाद/लातूर) - 93707 79002